

Frage 9

Nach welcher Therapiezeit kann bei Wegener-Granulomatose Cyclophosphamid durch Azathioprin ersetzt werden?

- a) nach 3–6 Wochen
- b) nach 3–6 Monaten
- c) nach 6–12 Monaten
- d) nach 12–18 Monaten

Frage 10

Welche Befunde liegen beim hämolytisch-urämischem Syndrom typischerweise vor?

- a) Fragmentozyten
- b) Erhöhung von LDH
- c) Erhöhung von Kreatinin
- d) Thrombozytose
- e) Erniedrigung von Haptoglobin

Frage 11

Das NPHS2(Podocin)-Gen spielt bei folgenden Erkrankungen eine Rolle:

- a) kongenitales nephrotisches Syndrom
- b) steroidresistentes familiäres nephrotisches Syndrom
- c) HUS
- d) MPGN
- e) Alport-Syndrom

Frage 12

Der Vererbungsmodus beim Alport-Syndrom ist bei über 85% der Patienten

- a) autosomal rezessiv
- b) autosomal dominant
- c) X-chromosomal dominant
- d) X-chromosomal rezessiv
- e) keine der genannten Antworten ist richtig

Frage 13

Welche Aussage zur Blutdrucksenkung bei hypertensiver Krise ist richtig?

- a) Normalwerte des Blutdrucks sollten möglichst schnell erreicht werden
- b) Eine rasche Senkung kann zur zerebralen Ischämie oder Erblindung führen
- c) Am sichersten fährt man mit einer allmählichen Blutdrucksenkung über mehr als 24 Stunden

- d) Bolusgaben langwirksamer Antihypertensiva sind aufgrund ihrer anhaltenden Wirkung besonders gut geeignet

Frage 14

Welche Aussage zur Plasmapherese trifft zu?

- a) Es können eiweißgebundene Substanzen entfernt werden
- b) Blutungen sind eine bekannte Komplikation
- c) Sie ist ein Standardverfahren in der Therapie des HUS
- d) Es gibt keine sichere Indikation im Kindesalter

Auflösung und Kommentar der Fragen auf Seite 320

Monatsschrift Kinderheilkd 2004 · 152:290
 DOI 10.1007/s00112-003-0896-1
 Online publiziert: 29. Januar 2004
 © Springer-Verlag 2004

Monatsschrift Kinderheilkunde, Band 151, Heft 12, S. 1342-1352

Mitteilungen der DGKJ und ÖGKJHK

Prävention von Muttermilch-mediierten CMV-Infektionen bei Frühgeborenen.

Konsensuspapier der Ernährungskommission der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, S. 1346-1347

DOI 10.1007/s00112-003-0855-2

In o.g. Konsensuspapier ist ein Druckfehler aufgetreten. Richtig muss es in der Absatzüberschrift auf S. 1346 lauten:

Vorschlag für Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht ≤ 1500 Gramm und einem Gestationsalter ≤ 32. SSW.:

Die Literatur ist auf der Homepage der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde veröffentlicht:

www.kinderundjugendheilkunde.at

Die Original-Version dieses Originalartikels finden Sie unter:

<http://dx.doi.org/101007/s00112-003-0855-2>